


EURneffy[®] nosový roztokový sprej v jednodávkovom obale adrenalin


Predtým, ako budete musieť EURneffy použiť, podrobne sa s ním oboznámte, vrátane toho, kedy a ako sa má použiť.

EURneffy nosový sprej:




Keď ste pripravený na použitie, postupujte podľa týchto pokynov.

A



Vyberte EURneffy nosový sprej z obalu.
Otvorte obal a vyberte EURneffy nosový sprej.

B



Nosový sprej držte tak, ako je to znázornené na obrázku.

Nosový sprej držte palcom na spodnej časti piestu a prstami na oboch stranách trysky.

- **Za piest neťahajte ani naň netlačte.**
- **Nevykonávajte testovanie ani skúšobné rozprašovanie; každý nosový sprej má len jednu dávku.**

C




Zasúvajte špičku nosového spreja do nosovej dierky, kým sa prsty nedotknú vášho nosa.


Trysku držte rovno v nose nasmerovanú k čelu.

Nosový sprej nenakláňajte na vnútornú ani vonkajšiu stenu nosa.

D



Pevne zatlačte piest, kým nezapadne a sprej nevystrekne do nosovej dierky.



Nosový sprej nenakláňajte na vnútornú ani vonkajšiu stenu nosa.



Vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc

Okamžite vyhľadajte rýchlu lekársku pomoc pre dôkladné monitorovanie anafylaktickej epizódy a v prípade, že je potrebná ďalšia liečba.



Monitorujte príznaky pacienta



Ak sa príznaky po približne 10 minútach naďalej zhoršujú alebo sa opakujú, alebo ak dôjde k akejkoľvek chybe pri podávaní, podajte druhú dávku pomocou nového nosového spreja EURneffy do ROVNAKEJ nosovej dierky a urýchlene vyhľadajte lekársku pomoc.

V prípade potreby si môžete ľahnúť so zdvihnutými nohami. Ak sa vám takto ťažko dýcha, posadte sa. Pacientov v bezvedomí treba uložiť na bok do stabilizovanej polohy. Ak príznaky neustupujú, mali by ste, ak je to možné, zostať s inou osobou, kým nepríde lekárska pomoc.



ALK-Abelló A/S
Bøge Allé 6-8
2970 Hørsholm, Dánsko